

**THE ANALYSIS OF SENSITIVITY AND DIAGNOSTIC EFFICACY OF THE TEST SYSTEM
OF INDICATION AND IDENTIFICATION
OF BACTERIA B.BRONCHISEPTICA**

**Vasilyeva Y.B.¹, Mastilenco A.V.¹, Vasilyev D.A.¹, Badaev R.R.², Merhcina S.V.¹,
Shvidenko I.G.³, Skorik A.S.¹**

1 FSBEI HPE "Ulyanovsk state agricultural Academy named after P.A. Stolyipin", Ulyanovsk, Russia

(432017 Russia, Ulyanovsk, Boulevard New Crown-1), grant-ugsha@yandex.ru

2 Research financial law University, Moscow, Russia (117447, Moscow, street Carmustine, da, P6),
vidagon@mail.ru

3 FSBEI HPE "Saratov agrarian University named after N.I. Vavilov", Saratov, Russia,
(410012, Saratov, Theatre square, 1)

The paper presents results of a study of analytical sensitivity and diagnostic efficacy of the test system of indication and identification of bacteria *B.bronchiseptica* (TSII BBR). TSII BBR includes bacteriological, immunological, molecular genetics and phage components, provides early and accurate diagnosis of *Bordetella*. The analytical sensitivity of bacteriological and immunological components of the test system is not less than 104 microbial cells in ml, molecular genetics and phage - not less than 103 microbial cells in ml. Bacteriological, immunological, phage components should be used in the early stages of the disease (not later than the third week), before treatment with antibacterial drugs. At a later date and on the background of antibiotic therapy inoculation significantly reduced. PCR is more effective in the later stages of the disease and on treatment with antibiotics, but the maximum efficiency of the method on 1 - 3 week from the onset of the disease. Antibiotics may lead to false-negative result of the analysis. The term laboratory tests using the test system of indication and identification of bacteria *B.bronchiseptica* is from 1 to 4 days.

**КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО
ГОМЕОСТАЗА АКТИВИРОВАННЫХ НЕЙТРОФИЛОВ И СИСТЕМЫ ПОЛ-АО
У СПОРТСМЕНОВ В РАЗЛИЧНЫХ ПЕРИОДАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА**

Величко Т.И.¹, Гришина Е.И.²

1 ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», Самара, Россия

(443011, г.Самара, ул. Ак. Павлова, 1), e-mail: tivelichko@mail.ru

2 ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса», Тольятти, Россия
(445677, Самарская область, г. Тольятти, ул. Гагарина, 4),
e-mail: elena.grishina2010@mail.ru

У спортсменов с разной направленностью тренировочного процесса (пловцов и баскетболистов) проведен анализ результатов изменения динамики показателей функционального состояния активированных нейтрофильных гранулоцитов крови и системы «Перекисное окисление липидов -Антиоксиданты» (ПОЛ-АО) в различные периоды подготовки годичного цикла. Установлено наличие корреляционных связей между уровнем функционирования системы ПОЛ-АО, функциональным состоянием нейтрофильных гранулоцитов и уровнем физической работоспособности. Во всех периодах годичного цикла у пловцов установлены выраженные корреляционные связи, у баскетболистов – они менее выражены. Окислительно-восстановительный гомеостаз активированных нейтрофилов и соотношение прооксидантной и антиоксидантной систем в плазме и эритроцитах периферической крови у спортсменов может меняться в зависимости от индивидуального состояния организма и степени интенсивности тренировочного и соревновательного процесса.

**CORRELATION ANALYSIS OF REDOX HOMEOSTASIS ACTIVATED NEUTROPHILS
AND SYSTEMS POL-AO SPORTSMEN IN DIFFERENT PERIODS
OF THE ANNUAL CYCLE**

Velichko T.I.¹, Grishina E.I.²

1 FGBOU VPO "Samara State University", Samara, Russia (443011, Samara, ul. Ak. Pavlov, 1),
e-mail: tivelichko@mail.ru

2 FGBOU VPO "Volga State University of Service", Togliatti, Russia
(445677, Samara region, Togliatti, st. Gagarin, 4),
e-mail: elena.grishina2010@mail.ru

Because of stress factors, physical exercise is one of these factors, which influences of neutrophils granules of blood. Athletes from different directions of the training process (swimmers and basketball players) analyzed the results of changes in the dynamics of the functional condition of activated neutrophils and blood system "Lipid peroxidation-antioxidant" (POL-AO) in different periods of the annual cycle of training. The presence of correlation between the level of functioning of the POL-AO, the functional state of neutrophils and the level of physical performance. In all periods of the annual cycle swimmers installed expressed correlations, in basketball - they are less pronounced. Redox homeostasis of activated neutrophils and value prooxidant and antioxidant systems in plasma and erythrocytes in the peripheral blood of athletes may vary depending on the individual condition of the body and the intensity of training and competitive process.